

## خونریزی دهنده کریمه کونگو یا CCHF چیست ؟

یکی از بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان و یک بیماری تب دار حاد و خونریزی دهنده است که عمدتاً توسط کنه منتقل می شود .

این بیماری نخستین بار در کریمه (اوکراین) و همین طور در کنگو (زئیر) گزارش شده است و به همین دلیل نام تب خونریزی دهنده کریمه - کنگو به خود گرفته است.

## راههای انتقال این بیماری چیست؟

۱- کنه : عفونت در انسان پس از گزش توسط کنه یا له کردن آن ریو پوست ایجاد می شود.

۲- تماس با خون ، ترشحات و بافت حیوانی آلوده ، در هنگام ذبح دام ، کمک به وضع حمل دام و قطعه قطعه کردن گوشت تازه دام آلوده جهت طبخ غذا می تواند موجب انتقال ویروس به انسان شود.

۳- انتقال انسان به انسان: تماس با خون و ترشحات آلوده بیماران به ویژه در مرحله خونریزی یا انجام هرگونه اقدامی که منجر به تماس انسان با خون آنها شود، نیز باعث انتقال بیماری می شود.



۱

## علائم این بیماری چیست ؟

بیماری یا تب ناگهانی ، ضعف، سردرد شدید ، درد عضلانی خصوصاً ناحیه پشت و ساق پاها و بی اشتها بی ظاهر شده و خونریزی های زیر پوستی از روز چهارم بیماری دیده می شود. همچنین خونریزی از لثه ، بینی، ریه ، روده و رحم در موارد شدید و مرگبار بیماری مشاهده میگردد.

## هشدار:

در کشور ما شایعترین راه انتقال ، ذبح دامهای آلوده و تماس با لاشه دام ، خون و احشاء پس از ذبح آنها بوده است.

## توجه :

گروههای در معرض خطر بیماری کارکنان کشتارگاهها ، قصابان ، دامداران ، دباغان ، خانمهای خانه دار و کارکنان بهداشتی می باشد. هشدار: بیماری تب خونریزی دهنده در دامها علائمی ندارد.



۲

## راههای پیشگیری از بیماری چیست ؟

۱- با توجه به اینکه ناقل اصلی بیماری کنه است دامها را در محل زندگی خودمان نگهداری نکنیم.

۲- از گوشت دام ذبح شده در کشتارگاهها استفاده نماییم و از خرید گوشت از قصابان غیر مجاز خودداری کنیم.

۳- هنگام ذبح دام و خوردن گوشت آن از دستکش ، لباس کار، چکمه و عینک استفاده کنیم.

۴- در صورت نیاز ، دام زنده را از مراکز عرضه بهداشتی دام تهیه نماییم.

۵- با راهنمایی سازمان دامپزشکی محل نگهداری دامها را جهت از بین بردن کنه ها سمپاشی نمائیم و از له کردن کنه ها خودداری کنیم.

۶- از خوردن جگر تازه به صورت خام خودداری کنیم و پس از نگهداری گوشت و جگر تازه در طبقات یخچال به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت و بعد از پختن کامل مصرف نماییم.

۶- اصول حفاظتی و بهداشتی در برخورد با بیماران مشکوک به این بیماری توسط پزشکان و سایر پرسنل بیمارستانی و همراهان بیمار رعایت گردد.

این بیماری قابل درمان است و در صورت تشخیص سریع و درمان به موقع از شدت بیماری و کشندگی آن کاسته میشود.



۳



بیمارستان فرمانیه

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

## تب خونریزی دهنده کریمه کنگو



تاریخ تدوین: بهار ۹۰

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۰

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۳

Code : FH-Pam:9-128

## پیشگیری از بیماری تب کنگو:

۱- گوشت را بعد از تهیه، ۲۴-۱۲ ساعت در یخچال نگهداری کنید (نباید گوشت در ۲۴-۱۲ ساعت اول یخ بزند) و سپس آن را قطعه قطعه کنید زیرا بعد از این زمان عوامل بیماری زای تب کریمه کنگو از بین خواهند رفت.

۲- استفاده از دستکش هنگام قطعه قطعه کردن گوشت


۳- استفاده از دستکش، چکمه، عینک، گان و ماسک جهت قصابان هنگام ذبح دام

لازم به ذکر است که این بیماری واکسن ندارد.

هشدار بهداشتی: از خرید گوشتهای بازرسی نشده بدون مهر دامپزشکی (کشتار غیر مجاز) خودداری کنید.

مددجوی گرامی

در صورت بروز هر گونه مشکل بلافاصله به بیمارستان مراجعه نمایید.



© Shadine.ir

## چرخه انتقال بیماری




Figure 4. Example of CCHF virus circulation: transmission by the *Hyalomma marginatum rufipes* ticks. Context: Pierre Nabeth. Crimean-Congo Haemorrhagic Fever Virus In Emerging Viruses in Human Populations (Edward Tabor, editor) Elsevier Science, 2007, (England). Figure-3, p 307.




Figure 5. Number of Crimean-Congo hemorrhagic fever cases and deaths in Turkey between 2002-2008.<sup>32</sup>