

بیمار محترم :

در زیر اطلاعاتی در جهت افزایش آگاهی شما راجع به داروی دیگوکسین آورده شده است.

دیگوکسین دارویی است که باعث بهتر شدن نامنظمی ضربان قلب شما می شود. و برای بیماری فعلی شما تجویز شده است برای مصرف آن به نکات زیر توجه فرمایید.

۱- این دارو باعث کم کردن تعداد ضربان قلب شما می شود بنابراین قبل از مصرف دارو روزانه می توانید نبض خود را کنترل کنید به صورتی که در امتداد انگشت شست خود نبض خود را یک دقیقه بشمارید و در صورتی که کمتر از ۶۰ و یا بیشتر از ۱۰۰ بود با پزشک خود تماس بگیرید.

۲- دوز درمانی این دارو با دوز مسمومیت دارو بهم نزدیک می باشد بنابراین احتمال مسمومیت با این دارو زیاد است.



۳- در صورت بروز علائم مسمومیت حتما به پزشک مراجعه کنید : این علائم عبارتند از : بی اشتها، تهوع، استفراغ، سردرد، بیقراری، افسردگی، سرگیجه، اختلال دید، اسهال، یبوست، کاهش ضربان قلب.

۴- این دارو با غذاهای حجیم و حاوی فیبر از جمله کاهو و سبزیجات مصرف نکنید زیرا جذب دارو در بدن کم می شود.

۵- در مدت مصرف دیگوکسین، از مصرف داروهای جدید بدون دستور پزشک خودداری نمائید.

۶- این دارو از طریق کلیه دفع می شود بنابراین عملکرد کلیه شما اهمیت دارد.

۷- داروی دیگوکسین را همزمان با آنتی اسیدها مثل شربت معده، کلیسترآمین یا ملین ها مصرف نکنید



بیمارستان فرمانیه

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آموزش به بیمارانی که تحت درمان با قرص

دیگوکسین می باشند



تاریخ تدوین : بهار ۹۰

تاریخ بازنگری : ۱۴۰۰

تاریخ بازنگری بعدی : ۱۴۰۳

Code : FH-Pam:9-122

۱۱- اندازه گیری سطح پتاسیم سرم نیز دارای اهمیت می باشد که طبق دستور پزشک انجام می شود.

۱۳- داروی خود را طبق دستور پزشک و هر روز در ساعت معین مصرف نمائید در صورت فراموش کردن ۲دوز با پزشک خود تماس بگیرید.

با آرزوی سلامتی و موفقیت برای شما

۸- هر روز خود را در شرایط استاندارد وزن کنید افزایش وزن بیشتر از یک کیلو گرم را گزارش نمایید.

۹- در صورت مصرف این دارو پس از غذا سرعت جذب کاهش می یابد اما مقدار کلی جذب تغییری نخواهد کرد.



۱۰- در صورت کاهش پتاسیم خون، مسمومیت با دیگوکسین سریعتر اتفاق می افتد . بنابراین سعی کنید موادی مانند خیار ، موز، خرما، آب گوجه فرنگی که غنی از پتاسیم است مصرف نمایید.