

## کنده شدن زودرس جفت یا دکولمان

به جدا شدن جفت از محل اتصالش به دیواره رحم قبل از شروع زایمان جنین دکولمان جفت می گویند ، که میزان شیوع آن حدود ۱ در ۱۵۰ در زایمان است.

### علل :

- ◇ افزایش فشار خون ناشی از حاملگی
- ◇ فشار خون مزمن قبل از بارداری
- ◇ سابقه دکولمان در حاملگی قبلی
- ◇ پارگی زودرس کیسه آب
- ◇ ترومای خارجی (ضربه)
- ◇ سیگار کشیدن ، مصرف کوکائین و الکل
- ◇ لیومیومهای رحمی
- ◇ سن بالای مادر و مولتی پارینه (زنی که بیش از یک بار زایمان کرده است)
- ◇ اتساع رحمی ( حاملگی چند قلبی ، هیدر آمینوس )
- ◇ بند ناف کوتاه
- ◇ گروه خونی مادر

به دنبال یک بار دکولمان ، انسیدانس رکورنس ۱۰ تا ۱۷ درصد است و به دنبال دوبار دکولمان، انسیدنس رکورنس از ۲۰ درصد تجاوز می کند .

دکولمان های منتج به مرگ جنین ، در ۵۰ درصد موارد با هیپر تانسیون ( افزایش فشار خون ) حاملگی همراه هستند.

### علائم بالینی دکولمان:

- ◇ خونریزی واژینال در ۸۰ درصد موارد
- ◇ تندرس رحمی و درد شکم یا پشت، در دو سوم موارد
- ◇ دیسترس جنینی در ۶۰ درصد موارد
- ◇ کنتراکشن های ابنورمال ( انقباضات غیر طبیعی رحم ) در ۳۴ درصد موارد
- ◇ زایمان زودرس در ۲۲ درصد موارد
- ◇ جنین مرده در ۱۵ درصد موارد
- ◇ افزایش شدت و فرکانس انقباضات رحمی ممکن است از زودرس ترین نشانه های تشخیص دکولمان باشد.
- ◇ خونریزی تیره ، گاهی اوقات دفع لخته و همراه با در د از مشخصات بارز خونریزی واژینال در دکولمان می باشد.

اگر زن بارداری در سه ماهه سوم ، ناگهان دچار افت فشار خون ، تکیکاردی ( افزایش ضربان قلب ) نبض ضعیف و سردی انتها گردد ، بدون این که خونریزی خارجی داشته باشد، اولین چیزی که باید مورد توجه قرار گیرد دکولمان است . حال اگر این خانم باردار فشار خون بالا هم داشته باشد وضعیت، خطرناکتر خواهد بود. چون به نوسات کم در حجم خون ، حساسیت نشان می دهند.

### انواع دکولمان :

**فرم مخفی :** خونریزی آشکار وجود ندارد و خونریزی در حفره

رحم محدود می شود ( ۲۰ % موارد )

۱- دکولمان ممکن است کامل باشد.

۲- عوارض، اغلب شدید است.

۳- اختلالات انعقادی در ۵ تا ۸ درصد موارد دیده می شود و مرگ

جنین در این موارد بیشتر است .

**فرم اکسترنال :** ۸۰ درصد موارد را تشکیل می دهد :

۱- خونریزی آشکار دیده می شود .

۲- دکولمان اکثر اوقات ناکامل است .



بیمارستان فرمانیه

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

## کنده شدن زودرس جفت یا دکولمان



تاریخ تدوین: بهار ۹۰

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۰

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۳

«تهیه و تنظیم: واحد آموزش»

Code : FH-Pam:9-73

با آرزوی سلامتی و موفقیت  
برای شما

عوارض فرم اکسترنال کمتر است و از شدت کمتری برخوردار است ، گاه در موارد دکولمان ناکامل نیز خونریزی ممکن است مخفی باشد.

حدود ۳۰ درصد خونریزی های سه ماهه سوم ناشی از دکولمان جفت است ، که معمولاً بعد از هفته ۲۶ حاملگی ظاهر می شود. دکولمان جفت یک حادثه اورژانسی است و بیمار هرچه سریعتر باید در بیمارستان بستری شود و تحت مراقبت مستقیم پزشک و اقدامات درمانی برای پیشگیری از عوارض جبران ناپذیر آن قرار بگیرد.

در مواردی که جنین زنده است ولی دارای دیسترس ، دکولمان شدید یا پیشرونده باشد ، همچنین خونریزی غیر قابل کنترل از یک رحم دارای انقباض و اتساع سریع رحم در اثر خونریزی مخفی بدون نزدیک بودن زایمان وجود داشته باشد، سزارین اورژانسی انجام می شود. ولی در مواردی که دکولمان خفیف و غیر پیشرونده و جنین مرده است زایمان طبیعی اندیکاسون دارد .